Versión 001
Fecha 14/08/2015

## Nombre del producto

REBELDE®

## Características del producto

**Fungicida líquido de acción preventiva y gran persistencia**

Formulado fungicida presentado en forma de suspensión concentrada compuesto de un ingrediente activo, oxicloruro de cobre, de acción preventiva sobre algunas enfermedades causadas por hongos patógenos que afectan a la vegetación y los frutos.

## Composición

Oxicloruro de cobre (expr. en Cu) 70% p/v (700 g/L)

## Nº de registro

Inscrito en R.O.P.F. con el nº 23.939

## Formulación

Suspensión concentrada (SC)

## Presentación

| Categoría | Formato | Uds./caja | Uds./palet |
|---|---|---|---|
| Fungicidas | 5 L | 10 | 450 |

## Recomendaciones de uso

| Cultivos | Enfermedad | Dosis |
|---|---|---|
| Ajos, Cebolla, chalote, Berenjena, Tomate, Brécol, Coliflor, Hortícolas de Hoja, Guisante verde, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes (excepto espárrago) | Alternaría, Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,15-0,25% (150-250 ml/hl) |
| Almendro, Frutales de hueso | Abolladura, Bacteriosis, Cribado, Monilia, Moteado | |
| Avellano | Bacteriosis, Monilia | |

**La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes**

**Kenogard**
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

| Cultivos | Enfermedad | Dosis |
|---|---|---|
| Frutales de Pepita, Higuera | Bacteriosis, Monilia, Moteado | |
| Frutales subtropicales, Granado | Bacteriosis, Cribado, Monilia, y moteado | |
| Garbanzo | Rabia | 0,15-0,25% (150-250 ml/hl) |
| Lúpulo | Mildiu | |
| Nogal | Bacteriosis, Monilia | |
| Olivo | repilo y Tuberculosis | |
| Ornamentales leñosas | Hongos endófitos y Royas | |
| Patata | Alternaria y Mildiu | |
| Pistacho | Alternaria, Bacteriosis | |
| Vid | Bacteriosis y Mildiu | |
| Cítricos | Aguado | 0,075% (75 ml/hl) |
| | Fomopsis, Hongos Endófitos | 0,125% (125 ml/hl) |
| Cucurbitáceas de piel comestible y Cucurbitáceas de piel no comestible | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Mildiu | 0,15-0,20% (150-200 ml/hl) |

## Plazo de seguridad y LMRs

| Cultivos | Plazo de seguridad | LMR mg/Kg |
|---|---|---|
| Ajos, Cebolla, chalote, Cucurbitáceas de piel comestible | 3 días | 5 |
| Guisante verde, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes (excepto espárrago) | 3 días | 20 |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | 7 días | 5 |
| Berenjena y Tomate | 3 días (invernadero)<br>10 días (aire libre) | 5 |
| Olivo y Pistacho | 15 días | 30 |

**La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes**

**Kenogard**
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

| Cultivos | Plazo de seguridad | LMR mg/Kg |
|---|---|---|
| Patata | 15 días | 5 |
| Vid | 15 días | 50 |
| Cítricos y Granado | 15 días | 20 |
| Lúpulo | 15 días | 1000 |
| Garbanzo | 15 días | 20 |
| Frutales de hueso, Frutales de Pepita y Ornamentales leñosas | No procede | 5 |

## Modo de empleo

Aplicar en pulverización normal.

Algunos cultivos son sensibles al cobre, tales como algunas variedades de manzano (Golden, Starking, Reineta, Jonathan, etc.), perales de agua (Blanquilla), melocotonero, cerezo, cucurbitáceas, patata, zanahoria. No se recomienda aplicar en estos cultivos, especialmente con tiempo frío y húmedo.

**VID:** no aplicar durante la floración.

**BERENJENA:** 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 6,75 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 700 l/Ha.

**CÍTRICOS** (Aguado) Tratamiento en otoño, pulverizando hasta una altura de 1,5 m.

**FRUTALES DE HUESO Y PEPITA:** Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1400 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha. por campaña.

**FRUTALES SUBTROPICALES:** Aplicar al 0,4% en tratamiento invernal.

**TOMATE:** 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 700 l/Ha.

**La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes**

**Kenogard**
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

## TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE

-Nocivo en caso de ingestión.
-Nocivo en caso de inhalación.
-Provoca irritación ocular grave.
-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
-Evitar respirar el aerosol.
-Llevar guantes, prendas y gafas de protección.
-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico si se encuentra mal.
-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
-Evitar su liberación al medio ambiente.
-Recoger el vertido.
-Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
-Lávese la ropa de protección después de usarla.

**NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.** (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

## RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

**Primeros auxilios**:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Valorar la realización de endoscopia digestiva.
- Control hidroelectrolitico.
- Controle la tensión arterial.
- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA.

---

**La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes**

**Kenogard**
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

- Riesgos de alteraciones hepáticas y renales.
- Atención: riesgo de neumonía química por aspiración.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**
**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**

## MITIGACIÓN DE RIESGOS

**ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.**
**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

**MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES**

Mamíferos: A
Aves: A
Peces: B Mediana peligrosidad para peces.

## GESTIÓN DE ENVASES

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Este envase una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



**Kenogard**
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es